

КОРЬ

– ЭТО **высокопатогенное,**
опасное заболевание



Корь передается в **6 РАЗ**
легче, чем грипп.

У КАЖДОГО
ПЯТОГО



заболевшего корью разовьются
осложнения, такие как ушные инфекции,
пневмония, необратимая потеря слуха
или энцефалит, вплоть до летального
исхода.



Наибольший риск **опасных**
осложнений угрожает детям до
5 лет и взрослым старше 20 лет.



Против кори существуют
безопасные и эффективные
вакцины. Они проходят
тщательные испытания, и **за**
50 лет использования
зарекомендовали себя как
очень безопасные.



Две дозы вакцины против
кори способны обеспечить
защиту от болезни
практически **на 100%**.

Через 3-4 дня на фоне усиления всех симптомов болезни появляется сыпь - пятнисто-папулезная, очень крупная, ярко-красная, сначала на лице, за ушами, на волосистой части головы, потом на шее и верхней части груди, на туловище, руках и ногах. Иногда в период высыпания происходит новый скачок температуры. Во время лихорадки ребенок обязательно должен лежать в постели и много пить.

ЕСЛИ ЗАБОЛЕВАЕТ КОРЬЮ МАЛЕНЬКИЙ РЕБЕНОК, особенно ослабленный предшествующими заболеваниями или имеющий врожденную патологию, возможен смертельный исход.

КОРЬ ОПАСНА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ. При заражении беременной женщины корью на ранних сроках беременности, в 20% случаев происходит самопроизвольный аборт или возникают пороки развития плода.



Переболевшие корью сохраняют стойкий иммунитет на всю жизнь.

В современных реалиях единственной эффективной мерой профилактики кори является **ПЛАНОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ**. Согласно Национальному календарю профилактических прививок Республики Беларусь:

- вакцинация против кори проводится детям в возрасте 12 месяцев;
- ревакцинация - в 6-летнем возрасте.

КОРЬ
защищаемся
ГРАМОТНО

КОРЬ ОПАСНА ОСЛОЖНЕНИЯМИ, среди которых - ларингиты и трахеобронхиты, воспаление легких, воспаление среднего уха, головного мозга, сердца и судороги, развивающиеся на фоне высокой температуры тела. Кроме того, после кори у переболевшего временно формируется состояние иммунодефицита (снижение защиты от других инфекций), что способствует наложению тяжелых бактериальных инфекций.

УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРЬЮ ПРИВИТЫХ В 25-60 РАЗ НИЖЕ, ЧЕМ НЕВАКЦИНИРОВАННЫХ, А РЕВАКЦИНИРОВАННЫХ - В ДЕСЯТКИ РАЗ НИЖЕ, ЧЕМ ПРИВИТЫХ ОДНОКРАТНО.

НЕ ЖДИТЕ, ЧТОБЫ ИНФЕКЦИЯ ЗАСТАЛА ВАС ВРАСПЛОХ! ЗАРАНЕЕ ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕЙ ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТЕ ОТ НЕЕ СВОИХ ДЕТЕЙ.

Министерство здравоохранения Республики Беларусь
ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»



КОРЬ - широко распространенное острое инфекционное заболевание.

Корь является одной из самых различных болезней, известных на сегодняшний день.

Корью болеют только люди. Ранее корь считалась исключительно детской инфекцией, в последние годы наблюдается рост числа заболевших среди подростков и взрослых.



Путь передачи инфекции - воздушно-капельный.

СИМПТОМЫ КОРИ.

Время от заражения до появления первых симптомов длится от 7 до 14 дней. Болезнь начинается с симптомов простуды:

температура 38-40 градусов, резкая слабость, отсутствие аппетита,

сухой кашель, насморк, конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаз).

Через 2-4 дня после первых симптомов болезни **на слизистой оболочке щек (напротив коренных зубов) возникают мелкие беловатые высыпания.**



На 3-5 день болезни появляется сыпь в виде ярких пятен, которые имеют тенденцию сливаться между собой.

Сначала сыпь обнаруживается за ушами и на лбу, затем быстро распространяется на лицо, шею, тело и конечности. Мелкие розовые пятна сыпи быстро увеличиваются в размерах, приобретают неправильную форму, иногда сливаются.

Сыпь держится 4-7 дней. На месте пятен остаются очаги коричневой пигментации, через 2 недели кожа становится чистой.

В период максимального высыпания, через 2-3 дня после появления сыпи, температура снова может подниматься до 40,5°.

Осложнения:

- ♦ воспаление среднего уха (отит),
- ♦ слепота,
- ♦ бронхопневмония,
- ♦ воспаление шейных лимфоузлов,
- ♦ ларингит,
- ♦ энцефалит,
- ♦ пневмонии (воспаления бронхов и легких),
- ♦ тяжелая диарея (понос),
- ♦ нарушения питания.

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ:

при малейшем подозрении на развитие кори следует незамедлительно обратиться к врачу;

больной изолируется на весь заразный период (до 4-го дня высыпаний);

Корь - острое вирусное инфекционное заболевание, характеризующееся повышением температуры, катаральным воспалением слизистых оболочек носа, глаз и горла и появлением на коже пятнистой сыпи.

Источником заражения является больной человек.

Пути заражения вирусом кори

- **воздушно-капельный**, при этом вирус выделяется во внешнюю среду с каплями слюны при разговоре, во время кашля, чихания и даже дыхания;
- **вертикальный** (от матери к плоду при беременности, родах и во время кормления грудью).

Болезнь высококонтагиозна. Не иммунизированные и не болевшие корью при контакте с больным заражаются в 100% случаях независимо от возраста.

Как проявляется корь?

- От момента попадания вируса в организм, до появления первых симптомов заболевания проходит от 11 до 21 дня, чаще 9-11 дней.

- С первых дней болезни возникает повышение температуры тела до 39-40°C, насморк кашель, конъюнктивит.

- На 4-5 день болезни появляется сыпь, очень крупная, ярко-красная сначала на лице, за ушами, потом на шею, верхней части груди, туловище, руках и ногах.

- У непривитых против кори детей и взрослых заболевание часто протекает в тяжелой форме и с осложнениями.

Чем опасна корь?

Корь опасна своими осложнениями, к которым относятся пневмонии, отиты, стоматиты ларингиты, трахеобронхиты лимфадениты.

К тяжелым осложнениям, наблюдающимся в любом возрасте, относятся менингоэнцефалиты, энцефалопатия, полиневрит, серозный менингит, энцефаломиелит.

Кроме того, после кори у переболевшего временно формируется состояние иммунодефицита

(снижение защиты от других инфекций), что способствует наслоению тяжелых бактериальных инфекций.

При заражении беременной женщины корью на ранних сроках беременности могут возникнуть пороки развития плода.

Как уберечь себя от кори?

Единственным способом защиты от кори является **плановая вакцинация**.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок:



- **вакцинация против кори осуществляется детям в возрасте 12 месяцев;**

- **ревакцинация в 6-летнем возрасте;**

Если Вы или Ваш ребенок заболели, НЕОБХОДИМО:

- срочно вызвать врача;
- до прихода врача избегать контактов с родственниками и другими людьми;
- в случае выезда за рубеж, сообщить врачу, в какой период и в какой стране Вы находились;
- при кашле и чихании прикрывать рот и нос, использовать платок или салфетку, чаще мыть руки с мылом;
- использовать средства защиты органов дыхания (маску или ватно-марлевую повязку);
- не заниматься самолечением.

ЗНАЙТЕ!

Комплексной эффективной вакциной профессионалы уже считают вакцину против кори, краснухи и эпидемического паротита (ММР) или ее аналоги. Она была разработана для детей старше 12 лет и предназначена для профилактики кори и эпидемического паротита.



В Республике Беларусь вакцинация против кори проводится в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок детям в 12 месяцев и в 6 лет бесплатно.

Кроме того, бесплатно вакцинировано проводится по эпидемиологическим показаниям (при наличии вероятного контакта с заболевшим корью и/или краснухой документально подтвержденный контакт) с наличием признаков против кори, а также лицам с отсутствующим защитным титром антител против кори.



Вакцина для вакцинации детей комплексной назальной вакциной производится Министерством здравоохранения Республики Беларусь за средства республиканского бюджета.

Взрослым, по желанию, могут приехать на платной основе.

ПОМНИТЕ!

Родители, которые отказываются от вакцинации своих детей против кори и других опасных заболеваний, подвергают риску здоровье и жизнь своих детей.

Иммунизация необходима каждому человеку!

Заботясь себе и своим детям от этой инфекции, Вы обеспечиваете и безопасность окружающих вас людей.

Источники информации: сайт ВОЗ, www.who.int, www.mchd.gov.by, www.mchd.gov.by

Как защитить себя и детей



от кори